


Premier Mémoire
Sur le
Spina Bifida.

Par Jean Jacques Louis Boin, Chirurgien Gradué,
Lieutenant de M. Le Premier Chirurgien du Roy à Dijon,
Chirurgien en chef du grand hôpital, Pensionnaire dans la
Classe de la Médecine à l'Académie des sciences, Arts
& Belles Lettres de la même Ville, & Associé de l'Académie
Royale de Chirurgie.

Ce Mémoire a été lu deux fois par l'Auteur à
l'Académie Royale de Chirurgie dans ses dernières séances
du mois de juillet & première du mois d'Avril 1760.
Il a été revû & corrigé en 1764 & augmenté de l'observation
de M. Sue & de celle de M. Gougeon.



ARC 41 n° 46




1.
Premier Mémoire sur la Spina Bifida.
Par J. J. L. Boivin.

Quelques Enfants naissent avec un vice de
Conformation dans les Vertèbres auquel on a donné
le nom de Spina Bifida, parcequ'ils ont l'épine
du dos fendue, totalement ou en partie, selon sa longueur;
de sorte que le canal de leur moelle épinière est changé
en une gouttière, plus ou moins évasée & étendue, qui
est formée par l'écartement d'un ou de plusieurs des
anneaux Vertébraux dont la réunion constitue ce
canal.

Le Spina Bifida interrompt quelquefois toute l'épine
Vertébrale, mais on l'a observé plus souvent sur les Vertèbres
de la colonne que sur les autres: Dans quelques sujets, il
n'y a que celles du dos qui soient affectées; dans d'autres,
on n'a trouvé l'écartement qu'à celles du col, ou à l'os
sacrum, & même Ruyseh a dit l'avoir vu borné à
une seule Vertèbre dont l'anneau n'étoit pas séparé, mais
simplement percé d'un trou (2).

Cette maladie est toujours compliquée & souvent masquée,
de sorte qu'elle est trompée par des traits de ressemblance, quelques
Auteurs avouent de bonne foi qu'ils l'ont confondue
avec d'autres Maladies. Une telle erreur est d'autant
plus funeste qu'elle met dans le cas d'avancer le terme
de la Vie des Enfants auxquels on s'occupe à la guérison:
mais

(2) V. And. Ruysehii Obs. Anat. Chir. Cent. obs. 56.



mais on ne court le risque d'y tomber que quand le Spina Bifida est incomplet, c'est à dire, lorsque l'écartement n'en qu'à un petit nombre de vertèbres. S'il les occupe toutes, s'il est complet, l'enfant est ordinairement mort-né; & dans le cas où il survivoit à sa naissance avec cette difformité, il ne seroit pas difficile de la reconnaître.


J'en propose de rassembler plusieurs observations sur les deux espèces de Spina Bifida, de donner peut-être quelques éclaircissements sur les causes, la complication & les signes de cette maladie rare & singulière. Je desirois y joindre des moyens curatifs plus efficaces que nous en avons jusqu'à présent. L'humanité gémit toujours, lorsque l'art paroît borné à n'employer qu'une cure palliative pour des maladies dont elle voudroit qu'on procurât la guérison radicale; à plus forte raison, quand elles affectent ces tendres rejetons, ces enfants du premier âge dans lesquels l'homme même espéroit de se voir renaître, & auxquels il se reconnoît forcé de survivre. Mais il n'est pas possible de les conserver longtemps, évitant au moins d'accélérer l'instance qu'ils separent de nous. C'est mon principal objet. Et en apercevant l'importance pour qu'il me soit permis de diviser ces ouvrages en deux Mémoires: dans le premier je parlerai du Spina Bifida complet; dans le second, de celui qui est incomplet.

Du Spina Bifida complet.

Je dois d'abord commencer cet article par la description d'un fœtus qui m'a été remis entre les mains & qui étoit atteint du Spina Bifida le plus complet & le plus complet que l'on puisse trouver.

(voir suite)





I. Obs. de l'Auteur
 Sur un Spina Bifida
 Complexe & compliqué
 d'une hernie du
 Cerveau, &c.

Une fille grosse inourue à Dijon au mois d'Avril
 1760 d'une affection cérébrale qui ne dura que quelques heures,
 sans que la grossesse parut contribuer à cette apoplexie, &
 sans que la malade donna aucun signe d'un accouchement
 prématuré. Après sa mort, on tira de son sein par l'opération
 Césarienne un fœtus femelle qui ne fut apporté sur le champ
 pour l'examiner. Il paroîtroit être du septième mois, &
 bien conformé dans toutes les parties extérieures de son corps,
 à la réserve de la tête & du dos. Il avoit onze pouces
 quatre lignes de longueur & beaucoup d'embonpoint. Sa
 mort avoit précédé de très peu de temps celle de sa mère,
 puisqu'il avoit résisté plusieurs jours à la punction avant
 qu'on le dissipât, même en le laissant exposé à l'air sans
 précaution & en le touchant souvent pour le faire voir à
 différentes personnes.


V. La figure de
 face & pointée.

La tête de ce fœtus femelle paroîtroit continue à la
 poitrine, sans que l'on apperçût aucun vestige de col: la
 face étoit un peu tournée du côté droit par la position oblique
 de la tête: les yeux étoient ouverts & très saillans, comme
 aux grenouilles; les oreilles étoient repliées de haut en bas
 & de devant en arrière; l'oreille droite touchoit l'épaule du
 même côté. Il n'y avoit ni sourcils, ni front. La partie
 chevelue commençoit au-dessus des paupières, s'avancoit
 en arrière de quatre lignes de longueur, où elle étoit
 arrêtée par une tumeur ovale, large de trois pouces &
 longue de plus de deux, dépourvue de la peau, très molle
 au toucher, de la couleur du foye, qui se portoit obliquement
 à droite & qui ressembloit après à une toque, ou à un bonnet
 à la dragonne.

L. A.



Au dessous



V. la fig. cy-jointe
n'est pas dernière.

Pl. B C D.

4.


Au dessous de cette tumeur, il y avoit jusqu'au milieu
du dos une espèce de plaque triangulaire fort large
supérieurement, terminée en bas par un angle tronqué,
recouverte d'une membrane peu épaisse, à travers laquelle
on distinguoit la moëlle épinière, à l'endroit où l'on
auroit dû sentir la portion postérieure des anneaux vertébraux,
à la place de laquelle on touchoit une gouttière allongée
& fourrage. A l'angle inférieur de cette espèce de plaque,
il y avoit sous la membrane une partie épaisse qui
paroissoit interrompre d'un côté la continuité de la gouttière.

La tumeur de la tête étoit formée par le cerveau
déplacé, qui n'étoit plus contenu sous une voûte de crâne
& qui étoit enveloppé de la dure-mère seule, comme la
dissection me le prouva. Il étoit d'une consistance inégale;
mais en général dans un état de laxité trop grande
pour permettre de distinguer aucune des parties qu'on y
remarque naturellement; il étoit confondu tellement
avec le cerveau qu'on ne reconnoissoit plus les traces de
celui-ci, & il ne restoit aucun vestige de la faux ni de la
tente du cerveau.

La moëlle de l'épine qui communiquoit avec le
cerveau dans le sac herniaire avoit peu de volume & après
de s'être par rapport à sa membrane propre qui l'enveloppoit,
elle fournissoit les cordons nerveux ordinaires qui passent
par les trous que les vertèbres réunies laissent entr'elles,
& se prolongeoit jusqu'à l'os sacrum.

Le squelette de ce fœtus offroit des singularités plus
remarquables que celles des parties molles. La face
ressembloit presque à celle du singe; les os du crâne, qui ont
peu de





4. les figures
desquelles par un
ingram.

peu de profondeur & qui ont chacune 8 lignes d'ouverture,
sont ensemble $\frac{7}{8}$ de toute la largeur de la face (fig. 1.).

Quant aux crânes, au premier coup d'ail on ne distingue que
la face supérieure de sa base (A. fig. 2.) dont les apophyses
piéieuses (BB) forment la partie protubérante: mais en voyant
la tête par le sommet, on reconnoît pourtant tous les
grands os qui forment le crâne, sans qu'ils forment de
boîte osseuse, & qu'ils soient très irrégulièrement
conformés.

Le foramen (C. fig. 2.) de près les osseux orbitaires est
presque bouché par son bord supérieur à la base du crâne (A).
Les Pariétaux (DD), au lieu d'être élevés de la base, descendent
vers les épaules, en formant comme des oreilles de chien,
& se replient ensuite sur eux-mêmes (fig. 1.). L'os Occipital
n'a point son grand trou & son osseux son apophyse basilaire
(E. fig. 4) attachée par des ligaments à la première vertèbre
du col. On y remarque les deux condyles, dont l'un (Fi)
est plus sensible que l'autre, mais sans se joindre à la vertèbre
Atlas ni l'un ni l'autre. Les Temporaux ont les osseux à peu
près dans la situation naturelle, mais leur portion écailleuse
est directement en dessous, & les deux cercles osseux du
tympan (F. F.), très rapprochés l'un de l'autre, ne peuvent
être aperçus qu'en regardant la tête par dessous (fig. 3.).

L'épine du dos (fig. 4 & 5) vue par devant présente
une convexité formée principalement par les vertèbres
dorsales supérieures (G). On n'y compte que vingt-trois
vertèbres, & c'est une des dorsales inférieures qui paroît
manquer; mais on la retrouve hors de rang à l'épine
vue par derrière (fig. 4), où la douzième dorsale (HH) est
de la dernière



déplacées de la Colonne Vertébrale, ayant seul le trou complet (fig. 3) destiné au passage de la moelle & solles à la première & à la seconde lombaires.

Le grand Canal de la moelle est changé en une large gouttière (1 fig. 4) qui occupe toute la longueur de l'épine & même celle de l'os sacrum; & les principales coque formes Lespinas osifides quise voient dans les mêmes sites. La Dage Commune des Apophyses épineuses est entr'ouverte dans toute sa longueur, & pas forsqeu les anneaux, dont la continuité fait le Canal, manquent; les autres Apophyses sont toutes écartées & rotées de côté, sans que le Corps de chaque Vertèbre ait souffert aucune altération dans sa forme, ni dans sa position.

Les Douze Vertèbres supérieures contribuent à former immédiatement au dessus de la tête un enfoncement si considérable (1.1. fig. 4 & 5.) qu'il n'en point etonnant que le fœtus entier parus n'ait point de sol. La portion droite de la seconde Vertèbre Cervicale (M. fig. 1.) manque absolument; de sorte qu'il n'y a de côté que sept trous pour le passage des nerfs cervicaux; l'Atlas n'a point de facettes articulaires, & son point de contact avec l'occipital certainement n'a pas une ligne d'épaisseur. Les parties latérales des Vertèbres du sol sont presque toutes fondées les unes avec les autres.

Au dessus de ce seul anneau inférieur qu'il y ait dans cette épine visière, & qui appartient à la douzième Vertèbre dorsale déplacée, la gouttière formée à l'extrémité inférieure, & à constituer une espèce de demi-Canal quise termine au bout de l'os sacrum.

Il y a lieu de croire qu'il y a un déplacement de cette Vertèbre



Vertèbres dorsales a occasionné le spinal bifida du fœtus que je viens de décrire; mais on ne doit point regarder l'écartement de l'épine Vertébrale comme une maladie essentielle; elle ne peut être que symptomatique. Aucune cause ne seroit suffisante pour séparer, ouvrir & porter de côté, tous les corps sans fractures, les anneaux des Vertèbres. Rien n'est capable que une autre maladie ait précédé le spinal bifida, & que le spinal bifida, quoiqu'il paroisse d'abord la maladie principale, ne soit qu'un effet de la première, un symptôme consécutif, plus marqué que les autres, & qu'il se développe lentement selon différens degrés.

Les structures de l'épine du fœtus le rend seul susceptible de ces écartemens. Cette colonne, remarquable par différentes courbures dans l'homme, n'en a qu'une seule dans le fœtus; c'est un arc dont la convexité est en dedans: elle dépend de la manière dont il s'insère dans la matrice, où ~~il~~ s'insère, pour ainsi dire, sur lui-même, il remplit une cavité ovale. Les apophyses épineuses des Vertèbres, quelque saillantes qu'elles soient dans l'homme, sont applaties dans le fœtus, & leur ossification n'y commence que fort tard: elles y sont même d'abord remplacées par un cartilage d'une assez grande étendue en largeur, qui réunit ces deux Kerkringius nomme les deux ailes des Vertèbres (A). Ce sont des petits os qui forment la partie postérieure de l'anneau & dont l'extrémité antérieure est jointe par une portion cartilagineuse, plus étroite aux parties latérales du corps de chaque Vertèbre. Ainsi elle est composée dans le fœtus de trois pièces osseuses, tandis



(A) A. Osteogenia Trichum. Cap. 12.

tandis que l'homme la donne seule pièce, dans l'ossification continue & plus solide s'oppose à la formation des os diformes, pourvu qu'il n'y ait point de ramollissement propre à la favoriser.

D'après ces vérités anatomiques, il ne sera pas difficile de se représenter le développement de cette maladie dans le fœtus que j'ai observé. Il suffira qu'une cause quelconque ait chassé de sa place naturelle la douzième Vertèbre dorsale, troublée hors de rang, pour qu'il se soit fait un grand désordre dans l'épine; & que cette Vertèbre ait été expulsée peu à peu dans les premiers mois de la grossesse, dans le temps que son fœtus n'étoit qu'une masse cartilagineuse, variée de quelques points ossifiés; sans s'être été tant à faire œuvre lors de son déplacement, la moelle de l'épine auroit pu souffrir une compression assez forte pour faire périr subitement le fœtus, qui a survécu plusieurs mois à cette luxation, vraisemblablement parce que la Vertèbre étoit alors dans un état de mollesse & de flexibilité.


Beaucoup plus que j'aye intention de faire entendre que la luxation d'une vertèbre entièrement ossifiée soit toujours suivie d'une prompte mort. Il ya quelques exemples qui doivent nous mettre en garde contre une assertion aussi générale.

II. 663. de Panarolo
luxation d'une vertèbre
cervicale à laquelle
le malade a survécu
plusieurs jours.

Le Panarolo tomba d'un arbre, dit Panarolo (A), sa chute fut suivie d'une luxation très formidable de la seconde vertèbre du cou, comme on le reconnut sur le cadavre; cependant le malade ne mourut que beaucoup de jours après son accident, perquam plurimos dies vixit.

Si la Vertèbre toute osseuse d'un adulte n'a point

(A) V. Don. Panarol, Pentecost. 2. 663. 26. 3. in sepulchret.
Ponchi - Don. 65. p. 427.



écrasé d'abord la moelle épinière en se déplaçant subitement
par une chute; combien, à plus forte raison, la Vertèbre en elle
d'un fatus y a-t-elle fait une compression faible? mais elle
a été suffisante pour valentir le cours de la lymphe dans la
substance médullaire, surtout dans son enveloppe qui se sont
gonflés & dont quelques vaisseaux ayant éclaté dans la
suite ont produit par leur rupture une épanchement
lymphatique, une véritable hydropisie du canal de l'épine.
On a observé plusieurs fois cette espèce d'hydropisie dans
le *Spina bifida*; on l'a même remarquée dans les adultes,
sans que la maladie dont je traite y eût paru.

III. Obs. de Wepfer
Sur une hydropisie du
canal médullaire dans
un adulte.

Wepfer rapporte que Jacques Spoetlin mourut après
s'être plaint longtemps d'une douleur à la région des lombes,
qui s'étendoit souvent jusqu'à la partie inférieure du ventre.
Il fut ouvert, & lorsqu'on inclina l'épine, il en sortit par
le haut une grande quantité de sérosité qui étoit amassée
& qui avoit séjourné dans le canal de la moelle épinière (2).

On peut donc présumer qu'il s'en forme une semblable
hydropisie dans notre fatus & que, puisque j'y ai trouvé la
moelle de l'épine dans la quatrième membrane qui l'enveloppe
immédiatement, le siège de l'épanchement étoit l'intervalle
naturel qui sépare cette quatrième du tissu ligamenteux, fait
en entonnoir flexible, dont tout le canal médullaire est
tapissé.

C'est sans doute l'affluence continuelle du liquide qui s'écoule
peu à peu des fabriques internes daires des Ailes Vertébrales à se
diviser, à s'étaler, à se renverser, & il en est résulté une
tumeur agueuse dorsale accompagnée d'un *Spina bifida*
complet. Mais dans le même temps la matière épanchée
dans le

(2) V. *Diss. de Symplicia*. Hist. 15. & insynchroet. Bonet
Tom. 2. p. 575.

Dans le tuiâ ligamenteux & dérivé les adhérences naturelles
qu'il a sentes avec les premières vertèbres du col, avec
l'enveloppe particulière de la moelle de l'épine. Ce liquide
ayant pénétré alors entre les muscles postérieurs de la tête
& l'os occipital encore mob à cet âge & divisé en plusieurs
pièces, il a produit un hydrocephale externe, une tumeur
aqueuse dont le foyer de l'épanchement étoit au dessus de
l'os du crâne.

Je dis un hydrocephale externe, contre l'opinion de
Platner qui prétend que l'hydrocephale réunit au spina
l'infidèle est toujours interne, qu'il a son premier & principal
siège dans les ^{ventricules du} cerveau, d'où cet Auteur fait parvenir les liquides
dans les grands canaux des vertèbres, & qu'ainsi l'hydrocephale
est lui même l'origine du spina l'infidèle (1). Les sentiments de
Platner peu ébranlés dans quelques cas: mais ils se vident
qu'on ne doit point l'admettre dans celui de notre fœtus,
tant parce que les fuites de l'épanchement des vertèbres est
suffisamment reconnue dans la luxation d'une vertèbre,
que par rapport à l'affaissement de la voûte du crâne.
En effet on remarque dans le plus grand nombre des enfans
hydrocephales que, quand l'épanchement est entre le crâne
& le cerveau, ou celui-ci & ses enveloppes de la voûte de cette
boîte osseuse est toujours plus large & plus élevée que dans
l'état naturel.

Dans notre fœtus au contraire, les os du crâne sont
exposés vers la base, & il a fallu pour leur donner cette forme,
que le foyer de l'épanchement ait été au dessus de ces os.

Je présume que de ce qu'un hydrocephale externe a été
incertain

(1) V. instit. Chirurg. §. 747.

un certain volume, cette tumeur a comprimé les lobes postérieurs du cerveau & le cervelet. A raisonnablement la mort de fœtus n'aurait pas été différée, si ces viscères n'eussent pas trouvé de la facilité à se porter vers la fontanelle; Et comme la compression s'en fait par degrés sur eux, selon l'affluence du liquide épanché, elle a forcé les dure-mères à s'allonger, à s'étendre peu à peu, à dilater ~~les~~ les parties molles qui composent la fontanelle, & à former les sac herniaires dans lequel le cerveau étoit renfermé.

Peut-être aussi qu'à proportion que le fœtus se développe & que le cerveau se échappe du frâne par le foramen, ils ont empêché la tumeur aqueuse de se porter vers le haut de la tête, ils l'ont obligé de s'étendre sur les parties latérales & ils ont concouru avec elle à jeter de côté & en dedans, à écarter, à repousser, à aplatis les os toujours flexibles qui ne s'étoient point opposés à leur sortie de l'intérieur du frâne; enfin ils ^{leur} ont donné cette forme singulière que l'on apperçoit sur le squelette. Or à leur tour ont contribué par leur affaissement à chasser le cerveau de sa place naturelle & à augmenter la enasse de la hernie.

Enfin il est probable que quand ces deux especes de tumeurs ont eu acquis un volume considérable, les téguments se sont déchirés, le kyste de l'hydrocéphale & de l'hydrociste médullaire s'en dilaté jusqu'à ce que l'expansion des fibres ainsée portée à son dernier terme, & il s'en ouvert spontanément dans le sein de la mère.

Il y a toute apparence que le fœtus a survécu quelque temps à cette rupture, puisqu'on n'a trouvé aucun vestige de ce sac, dans les lambeaux s'étoient collés sans doute aux lèvres de la plaie singulière du dos & de la partie postérieure de la tête. On peut en conclure que dans une hydrociste de la tête & de



tête & de l'épine, le couleuvre, lorsqu'il se frotte avec la naissance du fœtus, n'est pas toujours promptement mortel.

IV. Obs. de M. Bourgois, Maire en chirurgie à Angers, venant de la ville de Bourgois, sur un enfant qui avoit-il pas déjà fourni un exemple dans la description qu'il a donnée d'un enfant, dont la difformité avoit beaucoup de rapport avec celle du fœtus que j'ai examinée (2).

Cet enfant, né le 20 Décembre 1720, sans vie, au terme de neuf mois & du Volume ordinaire à cet âge, n'avoit, selon cet Auteur, ni crâne, ni os, ni moelle épinière, ni nerfs. Le Visage étoit situé comme d'habitude au dessus de l'œcil, & les mentons adhérents à la partie supérieure de la poitrine: Le nez, posé presque au sommet de la face, n'avoit qu'environ une ligne de saillie dans l'endroit le plus éminent. "Au côté de la racine du nez, tous au haut du visage, paroissoient
"deux yeux, dis M. Bourgois, deux Vespies de figures
"un peu ovales comme deux olives, pour lesquelles étoient
"renfermés les yeux, ce qui représentoit comme deux forner,
"principalement quand on examinoit ces enfants par la
"partie postérieure". Les deux oreilles avoient la forme
"rabaissée & retournées en devant comme celle d'un chat. Le
"conduct de l'air externe n'alloit pour servir d'entrée dans des
"parties opaques, telles que la roche, mais seulement dans
"une masse de glandes, de chairs & de graisse, tellement
"confondue qu'on ne pouvoit pas les séparer.

"Comme ces enfants n'avoient point de crâne, & par conséquent
"qu'ils n'avoient point de front, non plus que de parietaux, temporaux
"de. ajoutant l'Auteur, il y avoit derrière le visage, à la place
"du crâne, une partie de figure triangulaire, plate, recouverte
"de peau

(2) V. le Mémoire de Trousseau, Janvier 1751.


1. de peau seulement, qui m'infirmeroit un es après d'un de la même
 2. figures, lequel sembloit servir de baze & d'appui à la face.
 3. Cette peau étoit couverte de cheveux après courts & blanchâtres
 4. plantés, qui bordaient une ouverture oblongue à lever
 5. saillante dans laquelle on introduisoit facilement une
 6. grosse sonde tout le long de l'épine du dos qui ne fentenoit
 7. ni matière solide ni liquide.

M. Bourgois s'étoit proposé de décrire la queue de
 ces enfans; mais il n'a pas tenu à ma connaissance qu'il
 ait exécuté ce projet. Cependant on peut reconnaître par
 l'aveu qu'il fait de n'avoir point trouvé de matière solide dans
 tout le canal de l'épine, que ce qu'il étoit affecté d'un spina
 bifida complet, ou, ce qui revient au même, que ce canal
 étoit changé en gouttière dans toute sa longueur.

L'ouverture à lever saillante, qui commençoit à
 l'épine, montre certainement la route que la matière d'une
 hydropisie, & même la propre substance du fœtus & de la
 moelle épinière tombée en dissolution avoient suivie pour
 s'écouler. Quel changement prodigieux dans des parties
 nobles regardées comme nécessaires à la vie! Maintenant
 ces enfans, qui n'avoient plus ni fœtus, ni moelle épinière,
 & en qui l'on ne peut pas supposer que ces parties se fussent
 détruites tout à coup, est ne au terme le plus ordinaire de
 la grossesse & d'un volume proportionné à celui d'un enfant
 de neuf mois.



V. Obs. de M. Sue Le Señ. Patis par M. Sue 1.^{er} a présenté à
 l'Académie en 17 n'avoir pas été porté jusqu'à cette en-
 fante atteinte aussi d'un spina bifida complet. Le canal
 de l'épine ne fentenoit point non plus de substance
 une d'allure



médullaire; mais seulement un prolongement de la première lequel donnoit naissance à plusieurs autres prolongement qui se distribuoient en forme de nerfs.


Ce fœtus portoit sur la tête une espèce de sac membraneux qui paroissoit formé par la dure-mère & la pie-mère & qui lui tenoit lieu de la calotte du frâne. Ce sac ne renfermoit aucune substance molleuse, rien qui ressembloit au cerveau; mais seulement plusieurs filets qui, quoiqu'ils fussent fins en apparence, étoient dépourvus de même de substance médullaire & sembloient partir de la pie-mère, au-dessus en forme de prolongement.

Quoiqu'il n'y eût dans ce fœtus ni cerveau, ni cervelet, ni moelle épinière, M. Suer y reconnut bien distinctement, surtout aux bras, des nerfs bien différens de ces prolongement qu'il avoit aperçus sur l'épave, & dans le sac membraneux de la tête.

Les deux parietaux, la plus grande partie du frontal, toute la portion écailleuse des temporaux, & plus de la moitié de l'occipital manquoient au frâne de ce fœtus; de sorte que, parmi les os de la tête, on ne pouvoit guères distinguer que la base du frâne & les os de la face.

L'intérieur de la poitrine du même sujet offrit à M. Suer, comme à M. Souffrès qu'il éprouva dans cette dissection, une singularité peut-être encore plus frappante. Le lobe moyen du foie, l'estomac, la rate, & une grande partie des intestins furent trouvés dans la capacité de la poitrine du côté gauche: & les viscères abdominaux y avoient pénétré par une ouverture extraordinaire qui étoit faite au Diaphragme, & ressembloit à la suite d'une forte compression que ces viscères avoient soufferte par quelque cause que ce fût.

M. Souffrès



VI. obs. de M. Henry,
sur un spina bifida
complet.

C. 16. Henricus, Medico Danico, a donné les précis d'une de ses observations sur le spina bifida d'un fœtus (A). Il s'étendait depuis la tête jusqu'au cou: les Vertèbres cervicales étoient plus grandes & surtout plus larges que les dorsales: les quatre ou cinq supérieures même par un arrangement singulier paroissent tenir lieu de quelques os du crâne. On n'appercevoit presque point de côtes, & il n'y avoit aucun vestige de cerveau dans ce fœtus, dont le menton étoit attaché à la poitrine.

Il y a lieu de croire, malgré le silence de l'Auteur, sur ce fait, qu'un tel fœtus étoit mort-né, comme ceux des observations précédentes: néanmoins il n'en fut pas fondées qu'un enfant ne pût point naître avant aucun spina bifida très considérable. M. Henry, Maître en Chirurgie à Auxerre, rapporte l'exemple d'une petite fille qui a vécu trois jours, quoiqu'elle fut atteinte d'un spina bifida presque complet (B).

VII. obs. de M. Henry,
sur un spina bifida
presque complet dans
un enfant vivant.

En 1758, ce Chirurgien fut appelé pour visiter un enfant né de la Vierge, qui portoit une tumeur molle le long de la partie postérieure des Vertèbres dorsales & lombaires, dont il ne lui fut pas possible de découvrir la profondeur par le tact, mais à travers laquelle il reconnut distinctement qu'il n'atteignoit point le fœtus solide: que l'épine vertébrale auroit dû lui présenter. L'enfant étoit mort le 5^e jour après sa naissance, M. Henry ouvrit la tumeur. Elle renfermoit une grande quantité de pus formé dans un kyste produit par l'enveloppe commune de la moelle épinière, dont le canal ouvert étoit entièrement écarté par derrière depuis les premières vertèbres dorsales & à son ouverture par elle.



(A) V. Dipt. de Descriptione Veneris &c. Ruffini, 1748. & in Dipt. Anat. Halleri. Gotting. T. 7. p. 194.

(B) V. Le journal de Médecine, février 1760. T. 12. p. 158.



pas elle, jusqu'à l'os sacrum (*). Toute cette portion du canal étoit changée en une grande fosse naviculaire, enroulée d'une espèce de cartilage tier-blanc. j'ai vu cette pièce chez M. Henry. La partie cartilagineuse dont il parle avoit perdu de sa blancheur par vétusté. Les Vertèbres cervicales n'entroient pour rien dans ce Spina Bifida; & peut-être j'aurois dû n'en pas faire mention ici; mais sa grande étendue le rendoit presque complet, quoiqu'il approchât moins de ce degré que le Spina Bifida décrit par Bidloo.

VIII. Obs. de Bidloo,
sur un Spina Bifida
presque complet.

Ch. Orth, en parlant de l'Enfant attaqué de cette maladie, dont Bidloo a donné l'histoire, nous dit que tous les os des Vertèbres du dos & des lombes étoient ouverts par derrière, de sorte que les moelles de l'épine n'étoient point garanties par des os: Il ajoute que les trois Vertèbres cervicales inférieures étoient fort éloignées les unes des autres (2).

De six observations que j'ai rapportées sur le Spina Bifida complet ou presque complet, il y en a quatre par lesquelles on voit que les Enfants atteints de cette funeste maladie étoient dépourvus entièrement de moelle épinière: Elle n'étoit pas dévotée dans celui que Bidloo a décrit, (obs. viii.), ni dans les siens qui m'ont tombé entre les mains (obs. i.), quoiqu'il y ait diminué de Volume. Il ne seroit donc pas naturel d'attribuer l'écartement de leurs Vertèbres à un simple gonflement de cette substance moelleuse ou de son enveloppe; il dépendroit plutôt d'un épanchement quelconque dans le canal de l'épine; soit que la matière de l'épanchement



(*) C'est pas équivoque qu'il en dit dans le journal de méd. citée que quelques autres se terminoient à la première vertèbre cervicale.

(2) Diss. de Tumoribus Tunicatis. Auth. Orth. 1719. in Diss. Chir. Halleri. Lipsiæ. T. 5. p. 120.

l'épanchement sur la substance médullaire interne tombée en dissolution, ou convertie en pur, comme dans les siéges de M. Henry (obs. VII); soit qu'il y eût une hydroisie ^{simple} de ce canal, ou une compliquée d'hydrocephale comme dans quatre autres des Hottus (Obs. I. IV. V. VI.).

Le nôtre est le seul qui présente, dans le déplacement de la dernière Vertèbre du dos, une fausse manifeste de l'hydroisie Vertébrale, de l'épanchement dans le canal de l'épine qui en rompt la continuité, en ouvrant la flosion par derrière.

Aucun de ces Enfants ne nous a montré quel'hydroisie de la tête ait donné lieu à celle de l'épine. Les quatre qui réunissoient ces deux hydroisies n'étoient point atteints d'un hydrocephale interne: ^{L'espèce de changement dans la conformation naturelle des Os de leur tête & l'appâtissement} qu'ils avoient souffert prouvoient d'une manière évidente que l'épanchement s'étoit fait au dessus d'eux. q'ni examiné avec beaucoup d'attention le squelette que M. Henry en a fait voir (obs. VII). La Tête n'a aucune defectuosité; ses Os n'ont pas plus de Volume, ni d'écartement que le crâne d'un enfant de son âge en doit avoir. Si le Spina bifida étoit toujours produit, comme Statius & plusieurs Auteurs le prétendent, par une hydroisie médullaire qu'un hydrocephale interne accompagneroit & occasionneroit; la tête d'un enfant atteint d'un Spina bifida aussi considérable que celui de siéges décrits par M. Henry devoit conserver des Vestiges de la dilatation qui s'y seroit faite nécessairement; cependant elle n'offre aucune marque de l'hydrocephale interne supposé. Il suffit donc de reconnaître pour fausse du Spina bifida un épanchement primordial, soit qu'il tienne, soit scieur, soit lymphatique, dans le canal médullaire. Quelque

Soit le



Soit le liquide épanché, sa force sera toujours à peu près la même : En je ne doute pas qu'il se compose jamais dans le fœtus une des principales artères qui se distribuent aux enveloppes de la moelle de l'épine, & que le sang s'épanche entre elles, il n'en résulte un semblable écartement des vertèbres ; mais je n'en connois point d'exemple.

Il seroit inutile de m'arrêter à décrire les signes de l'apoplexie compliquée, lorsque la tumeur fœtale est ouverte. Les histoires que j'ai rapportées prouvent que cette maladie se manifeste au premier coup d'œil, & qu'elle a diverses complications sous aspects évidents. Mais si, avant l'ouverture de la tumeur, l'enfant naît pour vivre, le point le plus essentiel seroit en ce cas de ne pas faire d'abord que le foyer de cette tumeur fût bouché par les muscles & par les enveloppes communes du fœtus.

M. Henry ne s'y en prit pas ainsi. Il a jugé de la grande profondeur du foyer de l'épanchement, parce qu'en appuyant le doigt le long de l'épine, il n'a point distingué aucune de la colonne vertébrale qu'il auroit dû trouver au milieu du fœtus & dans le fond d'une tumeur qui n'auroit pas été accompagnée de l'écartement des vertèbres : il a reconnu latéralement des éminences osseuses, qui lui ont fait penser, à la vérité, que le corps même de chaque vertèbre étoit divisé en deux portions, tandis que l'ouverture de l'os de devant lui a démontré que la seule partie postérieure des anneaux vertébraux étoit séparée. Mais la première opinion que M. Henry avoit conçue de l'état de l'épine de ces enfants ne tiroit à aucune fâcheuse conséquence pour ces fœtus. Ce habile chirurgien avoit saisi l'essentiel ;

l'espérance; savoir, que la colonne épinière étoit vidée à tel point qu'il auroit accéléré la mort de l'enfant en ouvrant la tumeur qu'il lui faisoit le véritable délabrement de l'épine.

La différence de la mollesse quise rencontrera toujours dans cette espèce de tumeur àidera l'observateur attentif dans ses recherches sur la nature de la matière épanchée. La tumeur sera plus molle dans l'hydropisie vertébrale que dans l'abcès ou la dissolution médullaire; elle le sera ^{si elle étoit} moins ~~si elle étoit~~ anévrysmale, principalement par rapport aux couches fibreuses qui, à la suite de la coagulation d'une partie du sang épanché auroient pu se folles à toute la (insuffisance du foyer de l'épanchement); En il est vraisemblable que presque toujours un battlement ou un frémissement dans la tumeur, & quelquefois une échymose plus ou moins considérable dans ses environs déclarent aussi qu'un Anévrysme l'auroit produite.

Enfin les Paralysies des parties auxquelles se distribuent les nerfs émanés de la moelle épinière prouvera de nouveaux degrés de fertilité sur l'existence d'un fœtus difforme compliqué masqué par la tumeur. Il faudra encore avoir égard à quelques uns de signes que j'exposerais dans la suite, parce qu'ils ne seroient point placés ici dans le lieu le plus favorable.

Si l'on négligeoit de prendre ces éclaircissements, on pourroit regarder la tumeur comme un abcès &c. qui ne s'étendroient guère au delà des enveloppes communes, on espéreroit d'en favoriser la guérison par l'ouverture, & l'on se priveroit de prévoir une opération faite inconsidérément. La tumeur

une tumeur de cette nature, ce seroit occasionner une évacuation propre à épuiser sur le champ le malade, si la matière épanchée étoit médullaire, lymphatique ou sanguine. Ce seroit enlever, si elle étoit simplement séreuse, à la moelle épinière le faible soutien qui lui reste; en donner encore, si elle étoit purulente, accès à l'air, qui porteroit son action sur l'intérieur de la tumeur augmenteroit la perversion des sucs dont les parois seroient abreuvées, les rendroit plus âcres, plus pénétrants & plus putrides.

Le seul parti qu'il y ait à prendre dans une conjoncture aussi fâcheuse est de conserver, autant qu'il sera possible, l'intégrité de cette tumeur en la fortifiant par l'application de quelques médicaments toniques soutenus mollement par un bandage soutenu; en plaçant dans son berceau l'enfant sur le côté & de manière que la tumeur ne soit pas comprimée; en lui entretenant la liberté du ventre par des laxatifs, surtout si sa mère ne le nourrit pas.

Mais quoiqu'on fasse l'enfant périra bientôt. Nulle ressource pour lui dans une maladie aussi grave. Rien ne peut tarir la source de l'épanchement, rétablir la substance altérée de la moelle de l'épine, rapprocher les portions des vertèbres écartées. La Nature & l'Art seront toujours en défaut, lorsque l'épina bifida sera complet; à plus forte raison, quand il sera compliqué d'hydrocephale, de hernie du cerveau, ou de quelques autres maladies que ce soit. Vérité, qu'il est aussi triste d'avouer qu'importante de connaître; l'vérité, qui a peut-être encore lieu pour l'épina bifida incomplet,






incomplets, mais dans un sens moins étendu, jouissent,
malgré la crainte légitime qu'on a de ne jamais obtenir une
guérison radicale, ou ne laissent pas d'avoir l'espérance d'en obtenir
plus longtemps. La tierce malade, forme nous le verrons
dans un second Mémoire.









1228



ARC 41a 46





ARC 41 n° 46

